www.asadmath.com

اختبار الجزء الثالث / القطع الزائد

س: اختر الإجابة الصحيحة :-

① قطع زائد معادلته $9س^2 - 16ص^2 = 144$ $ن(س، ص)$ نقطة واقعة عليه ، جد بفرض الخلقة بين بعدي النقطة ن عن بؤرتي القطع
أ) 6 ب) 8 ج) 9 د) 16

② طول المحور الرئيسي للقطع الزائد $\frac{س^2}{25} - \frac{ص^2}{9} + 1 =$ صفر لسيادي
أ) 5 ب) 3 ج) 6 د) 10

③ قطع زائد معادلته $2س^2 - 3ص^2 + 18ص = ك$ ، فإذا قيم ك التي تجعل محوره الرئيسي موازيًا لمحور الصادات هي :-
أ) $ك > -27$ ب) $ك < -27$ ج) $ك > -27$ د) $ك < -27$

④ إذا كان المحور المرافق للقطع الزائد $\frac{س^2}{ل} - \frac{ص^2}{9} = 1$ أطول من محوره المستعرض عدد المحور الأصغر للقطع الناقص $\frac{س^2}{16} + \frac{ص^2}{ل} = 1$ هما قيمة ل
أ) 100 ب) 36 ج) 25 د) 12

⑤ أحد بؤرتي القطع الزائد الذي معادلته $\frac{س^2}{16} - \frac{ص^2}{9} = 1$ هما
أ) $(\pm 1، 4)$ ب) $(\pm 1، \sqrt{7})$ ج) $(\pm 1، 3)$ د) $(\pm 1، 5)$

⑥ في المعادلة $(ك-3)س^2 + (5-ك)ص^2 + 8س + 4ص = 12$ أوجد قيمة ك التي تجعل المعادلة السابقة تمثل قطعًا زائدًا
أ) $[2، 5]$ ب) $(2، 5)$ ج) $]-\infty، 5[$ د) $]2، \infty[$

⑦ تتحرك النقطة ن(س، ص) بحيث تحدد موقعها من بالعلاقة $\frac{س^2}{ل} + \frac{ص^2}{16-ل} = 1$ حيث ل وحدة وكذلك $ل < 16$ ، $ل > 0$ فإن المحل الهندسي لحركة النقطة ن هو :-
أ) قطعًا مكافئًا ب) قطعًا ناقصًا ج) قطعًا زائدًا د) دائرة .

⑧ أوجد معادلة القطع الزائد الذي أحد رؤوسه $(\pm 6، 0)$ وأحد بؤرتيه تقع على المحور المرافق له والذي هو أيضًا محور تماثل القطع المكافئ $س^2 = 4(ص - 16)$ ؟
أ) $\frac{س^2}{36} - \frac{ص^2}{64} = 1$ ب) $\frac{س^2}{64} - \frac{ص^2}{36} = 1$ ج) $\frac{ص^2}{36} - \frac{س^2}{64} = 1$ د) $\frac{ص^2}{64} - \frac{س^2}{36} = 1$

⑨ ما معادلة القطع الزائد المتطابق الأضلاع المجاور


أ) $16(س-8)^2 - 9(ص-3)^2 = 144$
ب) $9(س-8)^2 - 16(ص-3)^2 = 144$
ج) $16(ص-3)^2 - 9(س-8)^2 = 144$
د) $9(ص-3)^2 - 16(س-8)^2 = 144$

⑩ قطع زائد معادلته $\frac{(س+و)^2}{36} - \frac{ص^2}{64} = -1$ فإذا علمت أن بؤرتيه هما $(-6، \pm 10)$ فما قيمة و
أ) 2 ب) -2 ج) صفر د) 4

إعداد : أسعد مصطفى [99137750]
E-mail : class12math@gmail.com

س١ :- قطع زائد معادلته $9س^2 - 18س = 4ص^2 + 8ص + 31$

أوجد ① إحداثيات الرأسين
② إحداثيات البؤرتين
③ طول المحور الرئيسي ومعادلته
④ الاختلاف المركزي

(-1، -1)، (-1، -3)
(-1، √13 - 1)، (-1، √13 + 1)
ع = 1 ، ص = -1
ع = √13

س٢ :- أكتب معادلة القطع الزائد في الحالات التالية :-

① اختلافه المركزي $\frac{\sqrt{17}}{4}$ ومركزه نقطة تقاطع المستقيم $ص = 2$ مع محور الصادات ويمر بالنقطة (3، 2).

② احدى بؤرتيه (-1، 9) والرأس البعيد عنها هو (-1، 1) واختلافه المركزي = 2.

③ البؤرتان (2، -3)، (2، 5) ويمر بالنقطة (4، 1)

$\frac{(ص-3)^2}{9} - \frac{(ع+1)^2}{7} = 1$

$\frac{(ص-1)^2}{8} - \frac{(ع-2)^2}{8} = 1$

س٣ :- أوجد معادلة القطع الزائد الذي احدى بؤرتيه (12، 2) ويبعد البؤرة الأخرى بمقدار (10) وحدات عن طول المحور المرافق واختلافه المركزي = 2

ملاحظة: المحور البؤري هو المحور الرئيسي وهو المحور القاطع وهي تسميات مختلفة للمحور الرئيسي

والقطع رأسي.

الحل

$\frac{(ص-2)^2}{75} - \frac{(ع-12)^2}{25} = 1$

س٤ :- أوجد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما رأسا القطع الناقص الذي معادلته $9س^2 + 25ص^2 - 225 = 0$

وطول المحور المرافق هما طرفا المحور الأصغر لهذا القطع الناقص

$\frac{ص^2}{16} - \frac{ع^2}{9} = 1$

س٥ :- إذا كانت معادلة $\frac{(ص+3)^2}{ع^2} - \frac{(س-1)^2}{ع^2} = 1$

تمثل معادلة قطع زائد بؤرتاه (4، 1)، (-10، 1) أوجد

① الاختلاف المركزي. $\frac{5}{4}$

② معادلة المحور الرئيسي. $ص = 0$

س٦ :- تتحرك نقطة بحيث أن $س = 1 + 2ع$ قتا $ن$

$ص = -1 + 3$ ظا $ن$ ، $0 \le ن < \frac{\pi}{2}$

أوجد معادلة المحل هندسيا لحركة هذه النقطة.

$\frac{(ص+1)^2}{9} - \frac{(س-1)^2}{4} = 1$

س٧ :- تتحرك نقطة بحيث أن احداثياتها (س، ص) هي (1 + قا ه، ظا ه)

أوجد نوع المعادلة التي تتحرك عليها هذه النقطة

$(ص-1)^2 - (س-1)^2 = 1$ قطع زائد

س٨ :- أوجد معادلة القطع الزائد الذي مركزه هو رأس القطع المكافئ $(ص-3)^2 = 4(س-2)$

واختلافه المركزي = $\frac{5}{3}$ وبعد البؤرة = (5).

$\frac{(ص-3)^2}{36} - \frac{(س-2)^2}{64} = 1$ أو $\frac{(س-2)^2}{64} - \frac{(ص-3)^2}{36} = 1$



س٩ :- معتمداً على الشكل المجاور، إذا كانت $ن \times ن = 9$

وكان الاختلاف المركزي = $\frac{\sqrt{17}}{3}$ فأكتب معادلة القطع.

$\frac{ص^2}{9} - \frac{س^2}{9} = 1$

انتهت الأسئلة

أحبائي القطع الزائد ج/

إعداد : أسعد مصطفى [99137750]
E-mail : class12math@gmail.com